



# Buenas prácticas para la gestión sanitaria

## Protocolo para el control diario de terneros con enfermedades

### Busque terneros enfermos

Revise cada ternero durante la alimentación para controlar cualquier:

1. Apariencia anormal (aburrido, deprimido, débil o poco dispuesto a pararse, orejas o cabeza caídas, ojos hundidos)
2. Disminución del apetito (poco dispuesto a beber o beber menos de lo normal, esfuerzo de succión débil)
3. Heces anormales (diarrea)



### Examen de terneros enfermos

1. Temperatura rectal (la normal para un ternero es de 38.60C a 39.40C (101.50F a 103.0F))
2. Heces anormales (diarrea)
3. Estado de hidratación:
  - a. Normal: ojos brillantes y no hundidos, boca húmeda
  - b. Deshidratación leve: ojos ligeramente hundidos, boca húmeda
  - c. Deshidratación moderada a severa: ojos hundidos, boca seca, extremidades frías, no succiona
4. Respiración: respiración y esfuerzo

### Diarrea

#### Deshidratación leve:

- Electrolitos por vía oral 2 veces al día entre comidas durante 2 a 3 días o según lo indicado por el veterinario

#### Deshidratación moderada a grave:

- Requiere atención veterinaria para:
  - Fluidos intravenosos
  - Tratamiento con antibióticos
  - Tratamiento con antiinflamatorios

### Neumonía

- Tasas elevadas de respiración y esfuerzo
- Puede tener tos, secreción nasal
- Temperatura rectal elevada (superior a 38,4 C)



#### Leve:

- Terapia antibiótica según lo indicado por un veterinario
- #### Moderada a severa:
- Requiere atención veterinaria para:
    - Tratamiento con antibióticos
    - Tratamiento con antiinflamatorios

### Otros

**Busque atención veterinaria**

Fuente: Compilado por S.M. Godden, Universidad de MN, 2003.